



## OXYMETAZOLINE [HYDROCHLORIDE]

ชื่อสามัญ : OXYMETAZOLINE [HYDROCHLORIDE]

รูปแบบยา : สเปรย์พ่นจมูก

[ยานี้ใช้สำหรับ]

- ยานี้อาจใช้เพื่อรักษาโรคหรืออาการอื่นๆได้ หากมีข้อสงสัยควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
- ยานี้ใช้เพื่อช่วยบรรเทาอาการคัดจมูกที่มีสาเหตุจากโรคหวัด ภูมิแพ้ และใช้ละอองฟาง รวมถึงอาการคันและมีแรงดันในโพรงไซนัส
- การใช้ยานี้ในเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ควรใช้ภายใต้คำแนะนำของแพทย์ สำหรับเด็กอายุ 6-12 ปี ควรใช้ยาน้อย่างระมัดระวังและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของผู้ใหญ่

[วิธีการใช้ยา]

วิธีใช้ยาต่อไปนี้เป็นข้อมูลทั่วไปไม่ใช่สำหรับผู้รับใช้ยาเฉพาะราย โปรดปฏิบัติตามวิธีใช้ที่ระบุบนฉลากยาของท่าน

- ยานี้ใช้สำหรับหยอดจมูก โดยทั่วไปให้ใช้ยาทุก 10-12 ชั่วโมงเวลามีอาการ แต่ไม่ควรใช้บ่อยมากกว่า 2 ครั้งในช่วง 24 ชั่วโมง หรือให้ใช้ยานี้ตามวิธีใช้ที่ระบุบนฉลากยาอย่างเคร่งครัด ห้ามใช้ยาในขนาดที่มากหรือน้อยกว่าที่ระบุ และหากมีข้อสงสัยให้สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร
- การใช้ยานี้บ่อยกว่าหรือต่อเนื่องนานกว่าระยะเวลาที่กำหนด อาการคัดแน่นจมูกอาจแย่ลง หรืออาการอาจดีขึ้นแล้วกลับแย่ลงได้
- ห้ามใช้ยานี้ติดต่อกันนานกว่า 3 วัน ถ้าอาการคัดแน่นจมูกไม่ดีขึ้นใน 3 วัน ให้ปรึกษาเภสัชกรหรือแพทย์

[สิ่งที่ควรแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบ]

- ประวัติแพ้ยา oxymetazoline(hydrochloride) หรือยาอื่นๆ
- ใช้หรือกำลังจะใช้ ยาอื่นๆ ทั้งยาที่แพทย์สั่งจ่ายและยาที่ใช้เอง วิตามิน อาหารเสริม และสมุนไพร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ยาสเตียรอยด์อยู่เป็นประจำ
- มีหรือเคยมีโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน ปัสสาวะลำบากเนื่องจากต่อมลูกหมากโต โรคของต่อมไทรอยด์ หรือโรคหัวใจ
- ตั้งครรภ์ วางแผนจะตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร
- ถ้าอาการคัดแน่นจมูกไม่ดีขึ้นใน 3 วัน ให้ปรึกษาเภสัชกรหรือแพทย์

[ทำอย่างไรหากลิ้มรับประทานยาหรือใช้ยา]

- ยานี้โดยทั่วไปให้ใช้เมื่อมีอาการเท่านั้น แต่ถ้าแพทย์แนะนำให้ใช้ยาเป็นประจำ โดยทั่วไปถ้าลืมใช้ยา ให้ใช้ยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าเป็นเวลาใกล้กับการใช้ยาครั้งต่อไป ให้ข้ามไปใช้ยาในครั้งต่อไปเลยโดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็นสองเท่า

[อาการอันไม่พึงประสงค์ทั่วไป]

อาการอันไม่พึงประสงค์อื่นที่อาจเกิดระหว่างใช้ยา หากเป็นต่อเนื่อง หรือ รบกวนชีวิตประจำวัน ให้ แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบ

มีดังนี้ แสบจมูก ปวดเหมือนถูกแมลงต่อย มีของเหลวคัดหลังไหลออกจากจมูกมากขึ้น แห้งในจมูก จาม คลื่นไส้ วิงเวียนศีรษะ ปวดศีรษะ นอนหลับยากหรือนอนไม่หลับ

[อาการอันไม่พึงประสงค์ที่ต้องแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทันที]

มีดังนี้

- หัวใจเต้นเร็วหรือช้ากว่าปกติ

[การเก็บรักษา]

- เกือบยานี้ในภาวะบรรจุก่อนที่บรรจุมา ปิดภาชนะให้สนิท และเก็บให้พ้นมือเด็ก
  - เกือบยานี้ที่อุณหภูมิห้องโดยไม่ให้อยู่ในที่ร้อนมากกว่า 30 องศาเซลเซียส เช่น บริเวณที่ถูกแสงแดดโดยตรง และไม่เก็บยาในบริเวณที่เปียกหรือชื้น
  - ทั้งยานี้เมื่อยาหมดอายุ
- 

มีปัญหาเรื่องยา กรุณาแจ้งชื่อกร ด้วยความปรารถนาดีจาก  
มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา